

10 Anhang

Tabelle 10.1 Verhaltensbudget: Mittlere Häufigkeit der Verhaltenstypen (Anzahl der Vorkommnisse) über 15 Minuten Beobachtungszeit

		Typ IIo	Typ III+	Typ IVo	Typ IV+	Typ Vo	Typ V+
"Ruhe"	"Jungtiere"	24,5	21,0	28,9	23,8	27,7	24,1
	"Adulte"	23,0	23,1	25,9	28,4	30,1	28,2
"Komfortverhalten"	"Jungtiere"	11,3	10,8	12,2	13,9	11,1	11,3
	"Adulte"	9,6	12,1	13,5	12,9	13,5	12,0
"Lokomotion"	"Jungtiere"	6,2	6,1	10,9	9,1	11,7	8,5
	"Adulte"	6,7	5,2	10,2	10,3	11,7	10,4
"Erkunden"	"Jungtiere"	15,2	20,6	21,4	22,8	19,7	22,5
	"Adulte"	19,6	18,5	21,7	21,2	21,0	23,5
"Graben"	"Jungtiere"	3,7	5,3	9,1	6,7	5,1	5,3
	"Adulte"	3,9	3,8	6,4	6,6	7,4	7,3
"Aufrichten"	"Jungtiere"	12,6	9,7	16,2	10,0	12,5	9,2
	"Adulte"	10,4	9,8	8,6	8,9	8,3	7,3
"Fressen"	"Jungtiere"	3,7	2,5	5,2	4,5	5,1	3,3
	"Adulte"	1,6	2,4	0,9	2,8	1,6	2,7
"Trinken"	"Jungtiere"	4,1	5,1	4,4	2,6	5,4	4,0
	"Adulte"	2,4	3,9	4,1	4,6	2,0	3,3
"Sozialverhalten"	"Jungtiere"	15,8	16,2	16,7	17,0	19,8	15,0
	"Adulte"	15,8	12,6	17,1	13,2	17,0	14,1
"Spielen"	"Jungtiere"	6,9	5,8	8,9	7,0	7,3	6,9
	"Adulte"	4,3	5,7	4,0	3,6	6,4	6,2




Abbildung 10.1 Aufenthaltsverteilung auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen bei den "Jungtieren" (9.-11. LW) über die gesamte Dunkelfase: Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Zeitanteil an der gesamten Dunkelfase [%]




Abbildung 10.2 Aufenthaltsverteilung auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen bei den "Adulten" (17.-19. LW) über die gesamte Dunkelperiode: Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Zeitanteil an der gesamten Dunkelperiode [%]




Abbildung 10.3 Verteilung der Kotboli auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen bei den „Jungtieren“ (9.-11. LW): Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Anteil an den gesamten Kotboli [%]




Abbildung 10.4 Verteilung der Kotboli auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen bei den „Adulten“ (17.-19. LW): Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Anteil an den gesamten Kotboli [%]




Abbildung 10.5 „Zusätzliche Koffotos“: Verteilung der Kotboli auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen von der 5. bis 12. LW („Alter 1“): Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Anteil an den gesamten Kotboli [%]




Abbildung 10.6 „Zusätzliche Kotfotos“: Verteilung der Kotboli auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen von der 12. bis 19. LW („Alter 2“): Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Anteil an den gesamten Kotboli [%]




Abbildung 10.7 Harnverteilung auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen in der 21. LW: Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang (mittlere Punktzahl entsprechend Punkteschlüssel 0-5)




Abbildung 10.8 Zellstoffverteilung auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen in der 20. LW: Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang (mittlere Punktzahl entsprechend Punkteschlüssel 0-10)




Abbildung 10.9 Verteilung der Futterpellets auf der Käfigfläche der verschiedenen Käfigtypen in der 21. LW: Mittelwerte für jeden Versuchsdurchgang, dargestellt als Anteil an den gesamten Futterpellets [%]