

6. Anhang




Abbildung 18: Postbox Test [140]

Setting: Ellenbogen auf dem Tisch/Bett ruhend, Unterarm erhoben:
„Ich sage einige einstellige Zahlen. Ich bitte Sie, den Zeigefinger zu heben und wieder zu senken, wenn zwei ungerade Zahlen aufeinander folgen. Bitte heben Sie also nicht den Finger, wenn auf eine ungerade Zahl eine gerade folgt. Haben Sie die Aufgabe verstanden?“

Probe (mit monotoner Stimme vorlesen: 1/sec.)

4 5 _ 3 2 1 6 7 _ 9 4 2 8 1 _ 3 1

Test –Start: (Zahlen, bei denen der Patient den Finger hebt, kringeln)

2 6 1 _ 3 4 8 9 6 9 _ 5 2 8 5 _ 7 6 5 4 4 2 3 _ 9 6 8
3 2 7 _ 1 4 7 8 1 6 9 _ 3 4 3 6 5 _ 1 2 1 8 4 7 _ 5 8
9 2 8 7 6 1 _ 9 2 4 4 3 _ 7 8 5 2 6 1 _ 3 4 8 9 6 9
_ 5 2 8 5 _ 7 6 5 4 4 2 3 _ 9 6 8 3 2 7 _ 1 4 7 8 1 6
9 _ 3 4 3 6 5 _ 1 2 1 8 4 7 _ 5 8 9 2 8 7 6 1 _ 9 2 4
4 3 _ 7 8 5 2 6 1 _ 3 4 8 9 6 9 _ 5 2 8 5 _ 7 6 5 4 4
2 3 _ 9 6 8 3 2 7 _ 1 4 7 8 1 6 9 _ 3 4 3 6 5 _ 1 2 1
8 4 7 _ 5 8 9 2 8 7 6 1 _ 9 2 4 4 3 _ 7 8 5

Auswertung:

Richtige:	_____
Falsch Positiv:	_____
Falsch Negativ:	_____

Abbildung 19: Attention Test [44]

Bewusstseinsgrad	Wach und orientiert (Erfragen v. Name und Geburtsdatum) Erweckbar durch minimale Stimulation (Name) Reagiert nur auf taktile Stimuli (Schütteln)
Körperliche Aktivität	Bewegt alle Extremitäten nach Aufforderung Nur schwache Bewegungen nach Aufforderung Unfähigkeit der willentlichen Bewegung
Hämodynamische Stabilität	MAP < +/- 15% des Ausgangswertes v. Einleitung MAP < +/- 15-30% des Ausgangswertes MAP > +/- 30% des Ausgangswertes
Respiratorische Stabilität	Patient atmet tief durch Tachypnoe mit gutem Hustenreiz Dyspnoe mit schwachem Hustenreiz
Periphere Sauerstoffsättigung	>90% unter Raumluft >90% unter 2-4 l/min Sauerstoff < 90% unter 2-4 l/min Sauerstoff
Postoperativer Schmerz	Kein oder nur geringer Schmerz (keine zusätzl. Analgetika) Moderater oder schwerer Schmerz, durch i.v.-Analgetikagabe kontrollierbar Anhaltender postoperativer Schmerz
Postoperative Übelkeit	Keine oder milde Übelkeit, kein Erbrechen Passageres Erbrechen bzw. Würgen (1x Gabe von 0,675 mg DHBP) erforderlich Anhaltende moderate bis schwere Übelkeit und Erbrechen (mehrmalige Therapie)
Verlegbarkeit auf die Station, falls Score > 12 und kein Punktwert < 1 in einer Einzelrubrik	

Abbildung 20: Aldrete-Score (modifiziert nach White) [47]

- I Normaler, sonst gesunder Patient
- II Patient mit leichter Allgemeinerkrankung
- III Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung
und Leistungseinschränkung
- IV Patient mit schwerer, lebensbedrohlicher
Allgemeinerkrankung
- V Moribunder Patient, Tod innerhalb von 24 Stunden
mit oder ohne Operation zu erwarten

Abbildung 21: ASA- Klassifikation [49]