

Die Bodenübersichtskarte 1 : 200 000 im Ausschnitt L3744 Potsdam, abgeleitet aus der Boden-geologischen Karte und der Flächendatenbank des Landes Brandenburg im Maßstab 1 : 50 000.

3 Bodenregion der Jungmoränenlandschaften

3.1 Böden der Grundmoränenplatten und (überwiegend) lehmigen Endmoränen

1

Verbreitet Regosol aus Flugsand, gering verbreitet Regosol und Regosol über Braunerde aus Flugsand über Schmelzwassersand und Urstromtalsand, gering verbreitet Braunerde und Podsol-Braunerde aus Flugsand über Geschiebedecksand
(3.1) RQn: a-as;
(2) RQn, RQ/BB: a-as//fg-ss(vs);
(2) RQn, RQ/BB, BBn: a-as//tu-ss;
(2) BBn, PP-BB: a-as//pky-ss(Sp);
(2) RQn, RQ/BB: a-as//pky-ss(vs);
(1) BBn: pky-ss(Sp)//fg-ss(vs)

2

Fast ausschließlich Braunerde und Podsol-Braunerde aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersand, selten Regosol und Regosol über Braunerde aus Flugsand über Schmelzwassersand
(3.2) BBn: pky-(k)ss(Sp)//fg-ss(vs);
(3.1) BBn, PP-BB: pky-ss(Sp)//fg-ss(vs);
(1) RQn, RQ/BB: a-as//fg-ss(vs)

3


Überwiegend Braunerde und Bänderfahlerde-Braunerde aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersand, verbreitet Fahlerde-Braunerde und Fahlerde aus Geschiebedecksand über Geschlebbemergel
(3.2) BBn, LFd-BB: pky-ss(Sp)//fg-ss(vs);
(3.1) LF-BB, LFn: pky-ss(Sp)//gm-cl(s)(Mg);
(1) BBn, LF-BB: pky-(k)ss(Sp)//gm-ls(Lg)

4

Überwiegend Fahlerde-Braunerde, Fahlerde und Braunerde-Fahlerde aus Geschiebedecksand über Geschlebbemergel, gering verbreitet Braunerde-Fahlerde, Fahlerde und Fahlerde-Braunerde aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersand oder Geschleblehm
(2) LF-BB: pky-(k)ss(Sp)//gm-cl(s)(Mg);
(2) BB-LF, BBn, LF-BB, LFn: pky-ss(Sp)//fg-ss(vs);
(2) LF-BB, LFn: pky-ss(Sp)//gm-cl(s)(Mg);
(2) LFn, BB-LF: pky-ss(Sp)//gm-cl(s)(Mg);
(2) LF-BB: pky-ss(Sp)//gm-sl(Lg);
(1) BBn: pky-(k)ss(Sp)//fg-ss(vs)

5

Verbreitet Braunerde und Fahlerde-Braunerde aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersand, verbreitet Braunerde-Fahlerde, Fahlerde und Fahlerde-Braunerde aus Geschiebedecksand über Geschlebbemergel
(3.1) BBn, LF-BB: pky-ss(Sp)//fg-ss(vs);
(3.1) BB-LF, LFn, LF-BB, YOn: pky-ls(Sp)//gm-cl(s)(Mg);
(2) LF-BB: pky-(k)ls(Sp)//gm-cl(s)(Mg);
(1) BBn: pky-ls(Sp)//gm-sl(Lg);
(1) LFn, BBn: pky-(k)ls(Sp)//fg-ss(vs);
(1) LF-BB: pky-(k)ls(Sp)//gm-sl(Lg)



3.4 Böden der Niederungen und Urstromtäler

6

Überwiegend Humusgley, Gley und Anmoorgley aus Flugsand, gering verbreitet Reliktgley aus Flugsand, gering verbreitet Braunerde und Gley-Braunerde aus Geschiebedecksand über Urstromtalsand, selten Kalkgley aus Flusskalksand über Flugsand
(3.2) GGh, GGn, GMn: ff-ss;
(2) rGG: fu-ss;
(2) BBn: GG-BB: pky-ss(Sp)//fu-ss;
(1) RQ/BB, RQn: a-as//tu-ss;
(1) GGc, GMc: ff-css//ff-ss

7

Überwiegend Niedermoor aus Torf über Flugsand, verbreitet Anmoorgley, Humusgley und Gley aus Flugsand, gering verbreitet Niedermoor aus Torf und Muddel über Flugsand
(3.2) HNN: og-Hn/ff-ss;
(3.1) GMn, GGh, GGn: ff-ss;
(2) HNN: og-Hn/ff-ss;
(2) HNN: og-Hn/ff-Fm/ff-ss

Böden anthropogener Landschaften

8

Überwiegend Versiegelungsfläche aus Beton, verbreitet Lockersrosem, Regosol und Kolluvisol aus Kipp-sanden über verschiedenen Substraten, gering verbreitet Hortisol, Braunerde und Reliktgley aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersand
(3.2) YV: n-Ybe, Ybl;
(1) YO, rGG: pky-ss(Sp)//tu-ss;
(1) OL, RQn, YKn: oj-ss//ff-ss;
(1) OL, RQn, YKn: oj-ss//t;
(1) RQn, YKn: oj-ss//oy-Yb;
(1) OL, RQn, YKn: oj-ss//s;
(1) YK, YK-GG: oj-ss//ff-ss;
(1) RQn, YKn: oj-ss//tu-ss;
(1) YOn, BBn: pky-ss(Sp)//fg-ss(vs)

Blatt L3744 Potsdam



Kleinmachnow 1997