

## 7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 4.1	Altersverteilung in der Studie (n=45)	Seite 18
Tabelle 4.2	Art und Anzahl der durchgeführten Prophylaxen vor Studienbeginn (n=42)	Seite 19
Tabelle 4.3	Baseline der dosisabhängigen Gruppen (A≤600mg/d, n=11; B=600mg/d-900mg/d, n=22; C=900mg/d-1200mg/d, n=12)	Seite 19
Tabelle 4.4	Prozentuale Verbesserung der subjektiven Migräneintensität nach 3 und 6 Monaten gegenüber Baseline	Seite 20
Tabelle 4.5	Mittlere Serumvalproinsäurespiegel der dosisabhängigen Gruppen nach 3 und 6 Monaten Therapie	Seite 22
Tabelle 4.6	Anzahl der eingenommenen Tabletten/Monat für die Behandlung der Migräneattacken bei Baseline und nach 6 Monaten Behandlung mit Valproinsäure (p<0,05)	Seite 25
Tabelle 4.7	Art und Anzahl der Nebenwirkungen in den einzelnen Dosisgruppen (n=13)	Seite 25
Tabelle 4.8	Gemessene Serumvalproinsäurespiegel und die dabei aufgetretenen Nebenwirkungen (n=13)	Seite 26

Abbildung 3.1	Kopfschmerzkalender der Kopfschmerzambulanz der Neurologischen Klinik der Medizinischen Fakultät der Charité – Universitätsmedizin Berlin	Seite 14
Abbildung 4.1	absolute Verbesserung der Migränetage und nach 3 und 6 Monaten Behandlung gegenüber Baseline	Seite 20
Abbildung 4.2	Korrelation der Valproinsäuredosis und den gemessenen Serumspiegel ( $\mu\text{g/ml}$ ) nach Behandlung mit Valproinsäure ( $R^2=0,49$ )	Seite 22
Abbildung 4.3	Spiegelabhängige Wirkung auf die Migräne-Attackenfrequenz nach einer Behandlungsdauer von 3 und 6 Monaten beim gesamten Patientenkollektiv	Seite 23
Abbildung 4.4	Anzahl der Migräneattacken/Monat im Vergleich zur Baseline	Seite 24