

9 Anhang

	Kontrolle			
	n	Mean	Std	Median
STA (%)	20	45,9	7,2	45,9
MTA (%)	20	0,0	0,0	0,0
ES (%)	20	46,8	4,9	46,3
CT (%)	20	13,2	5,6	11,0
EPI (%)	20	11,6	1,1	11,6
CEM (%)	20	5,3	2,9	4,5
BONE (%)	20	0,0	0,0	0,0

	Emdogain				Ax			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	11	60,7	3,7	59,6	10	71,7	5,3	70,7
MTA (%)	11	6,6	1,4	6,6	10	0,1	0,1	0,0
ES (%)	11	34,7	3,1	35,0	10	23,6	3,6	23,9
CT (%)	11	16,4	2,1	16,8	10	14,6	4,4	15,0
EPI (%)	11	16,9	2,8	17,6	10	16,0	1,4	15,9
CEM (%)	11	8,7	1,6	9,1	10	7,0	3,9	6,7
BONE (%)	11	11,7	3,2	12,0	10	1,6	1,2	1,8

	Bx				Cx			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	43,1	10,5	44,5	10	54,4	8,3	53,3
MTA (%)	10	0,1	0,1	0,1	10	4,4	1,6	4,3
ES (%)	10	63,0	8,2	61,7	10	27,9	10,4	27,8
CT (%)	10	17,5	3,6	17,6	10	19,7	4,0	18,9
EPI (%)	10	12,2	2,0	11,9	10	18,5	3,6	19,1
CEM (%)	10	6,0	1,3	6,1	10	8,6	2,6	9,0
BONE (%)	10	2,3	0,3	2,3	10	14,6	3,9	14,7

	rHAM				Fx			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	58,3	5,8	60,0	10	59,3	5,6	59,2
MTA (%)	10	5,4	2,4	6,2	10	3,4	1,5	2,8
ES (%)	10	40,0	7,8	37,0	10	30,1	3,6	30,2
CT (%)	10	11,6	2,9	11,6	10	18,6	7,1	17,6
EPI (%)	10	10,9	1,6	11,2	10	14,0	2,2	13,4
CEM (%)	10	7,0	2,0	7,4	10	8,4	2,5	8,9
BONE (%)	10	8,6	2,6	8,6	10	7,7	2,5	8,3

Tab. 10: Histomorphometrische Messungen nach 2 Wochen Heilungszeit.

	Kontrolle			
	n	Mean	Std	Median
STA (%)	20	51,8	3,8	52,4
MTA (%)	20	8,3	3,9	7,5
ES (%)	20	32,7	3,5	32,1
CT (%)	20	14,1	3,5	14,4
EPI (%)	20	20,0	1,6	19,6
CEM (%)	20	6,2	2,2	6,1
BONE (%)	20	11,1	2,2	11,4

	Emdogain				Ax			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	33,1	8,3	35,5	10	58,7	10,8	62,3
MTA (%)	10	20,4	2,7	19,3	10	4,7	2,6	4,5
ES (%)	10	41,7	10,5	41,2	10	29,4	12,0	27,5
CT (%)	10	25,5	3,1	25,6	10	23,3	6,0	22,8
EPI (%)	10	16,0	2,6	17,3	10	17,4	2,7	16,5
CEM (%)	10	22,7	5,4	25,8	10	12,4	3,5	13,6
BONE (%)	10	20,8	4,4	20,4	10	11,8	4,2	13,4

	Bx				Cx			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	41,0	5,3	41,3	10	65,8	4,0	65,7
MTA (%)	10	4,5	3,9	3,5	10	5,1	1,9	4,7
ES (%)	10	54,1	10,2	57,1	10	25,6	4,8	23,8
CT (%)	10	25,3	5,9	27,1	10	23,8	2,1	23,6
EPI (%)	10	10,9	0,9	11,3	10	13,9	1,2	13,7
CEM (%)	10	11,8	3,8	12,3	10	9,4	2,2	9,3
BONE (%)	10	10,2	2,8	9,6	10	10,8	2,7	10,8

	rHAM				Fx			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	48,7	2,4	49,1	10	25,2	3,5	24,3
MTA (%)	10	33,6	3,5	34,1	10	29,7	6,0	31,4
ES (%)	10	19,3	5,6	17,1	10	29,5	9,0	26,7
CT (%)	10	28,9	3,6	29,9	10	31,3	2,6	31,3
EPI (%)	10	11,7	1,2	12,3	10	13,6	1,4	13,3
CEM (%)	10	28,2	7,7	25,9	10	25,5	5,3	25,2
BONE (%)	10	26,2	5,8	28,2	10	28,9	2,3	30,6

Tab. 11: Histomorphometrische Messungen nach 4 Wochen Heilungszeit

	Kontrolle			
	n	Mean	Std	Median
STA (%)	20	48,9	12,4	49,7
MTA (%)	20	12,8	8,1	12,3
ES (%)	20	16,8	7,4	17,8
CT (%)	20	30,7	12,9	29,8
EPI (%)	20	11,8	4,2	13,9
CEM (%)	20	13,9	5,9	10,9
BONE (%)	20	20,8	5,5	20,8

	Emdogain				Ax			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	35,8	9,9	35,3	10	46,7	1,5	46,7
MTA (%)	10	15,1	6,2	15,0	10	16,7	1,9	17,2
ES (%)	10	42,7	13,2	38,6	10	35,9	4,8	35,7
CT (%)	10	29,3	7,0	29,5	10	24,6	1,9	24,2
EPI (%)	10	11,7	0,9	11,6	10	13,4	1,1	13,5
CEM (%)	10	19,5	5,6	21,9	10	18,5	2,7	18,8
BONE (%)	10	19,4	6,3	18,8	10	46,7	1,5	46,7

	Bx				Cx			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	28,1	3,6	28,7	10	60,7	5,1	59,2
MTA (%)	10	21,3	1,5	21,3	10	19,2	2,9	20,4
ES (%)	10	30,3	3,9	29,8	10	13,8	3,5	14,9
CT (%)	10	35,1	4,0	35,8	10	29,1	4,4	28,9
EPI (%)	10	11,7	1,2	12,0	10	14,5	2,7	13,8
CEM (%)	10	21,8	1,4	21,9	10	14,5	2,1	13,7
BONE (%)	10	24,9	4,9	25,9	10	17,5	3,4	18,9

	rHAM				Fx			
	n	Mean	Std	Median	n	Mean	Std	Median
STA (%)	10	31,4	2,6	31,5	10	42,3	6,9	41,2
MTA (%)	10	53,5	4,4	53,4	10	43,6	4,2	45,3
ES (%)	10	6,9	1,1	7,0	10	10,8	1,3	10,9
CT (%)	10	22,4	3,2	23,1	10	44,7	7,6	42,7
EPI (%)	10	8,3	0,7	8,4	10	12,6	2,5	12,6
CEM (%)	10	45,3	4,4	44,9	10	38,3	6,1	39,5
BONE (%)	10	45,5	3,2	45,0	10	39,9	4,3	42,2

Tab.12: Histomorphometrische Messungen nach 8 Wochen Heilungszeit.