

8 Literaturverzeichnis

Abahusain, M. A., J. Wright, J. W. Dickersen und E. B. de Vol (1991):
Retinol, alpha-tocopherol and carotinoids in diabetes.
Eur. J. Clin. Nutr. 53: 630-635.

Adin, C. A., L. D. Cowgill (2000):
Treatment and outcome of dogs with leptospirosis: 36 cases (1990-1998).
J. Am. Vet. Med. Assoc. 216: 371-375.

Adoncecchi, L., W. Marrocco, C. Suraci, P. Pecora, B. Gallinella, R. Porra und
G. Cavina (1984):
Effect of renal and liver failure on blood levels of vitamin A, its precursor (beta-
carotene) and its carrier proteins.
Boll. Soc. Ital. Biol. Sper. 60: 881-886.

Aizawa, S., Y. Kikuchi, M. Susuki und M. Furusato (1987):
Renal cell carcinoma of lower nephron origin.
Acta. Pathol. Jpn. 37: 567-574.

Andriole, V. T. (1985):
The role of Tamm-Horsfall protein in the pathogenesis of reflux nephropathy and
chronic pyelonephritis.
Yale J. Biol. Med. 58, 91-100.

Avis, P. J. (1977):
Autoantibodies to Tamm-Horsfall glycoprotein.
Contrib. Nephrol. 39: 305-315.

Ayatse, J. O. (1991):
Human retinol-binding protein: Its relationship to renal function and renal diseases.
West. Afr. J. Med. 10: 226-231.

Bachmann, S., I. Koeppen-Hagemann und W. Kriz (1985):
Ultrastructural localization of Tamm-Horsfall Glycoprotein in rat kidney as revealed by
protein A-gold immunocytochemistry.
Histochemistry 83: 531-538.

Bachmann, S., R. Metzger und B. Bunnemann (1990):
Tamm-Horsfall protein-mRNA synthesis is localized to the thick ascending limb of Henle's loop in rat kidney.
Histochemistry 94: 517-523.

Badgett, A., S. Kumar (1998):
Phylogeny of Tamm-Horsfall protein.
Urol. Int. 61: 72-75.

Balant, L., J.-C. Mulli und E. J. Fabre (1974):
Urinary protein analysis with sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis-
A comparison with other analytical techniques.
Clin. Chim. Acta. 54: 27-37.

Banaszak, L., N. Winter, Z. Xu, D. A. Bernlohr, S. Cowan und T. A. Jones (1994):
Lipid-binding proteins: A family of fatty acid and retinoid transport proteins.
Adv. Protein Chem. 45: 89-151.

Barber, P. J. (1996):
Proteinuria. In: BSAVA Manual of canine and feline nephrology and urology.
J. Bainbridge und J. Elliot (Hrsg.): Gloucestershire: British small animal veterinary
association, 75-84.

Baylis, C., B. M. Brenner (1978):
The physiologic determinants of glomerular ultrafiltration.
Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol. 80: 1-46.

Beetham, R., A. Dawnay, M. Menabawy und A. Silver (1988):
Urinary excretion of albumin and retinol-binding protein during normal pregnancy.
J. Clin. Pathol. 41: 1089-1092.

Behrend, E. N., G. F. Grauer und I. Mani (1996):
Hospital-acquired acute renal failure in dogs: 29 cases (1983-1992).
J. Am. Vet. Med. Assoc. 208: 537-538.

Bernard, A., A. Vyskocil, P. Mahieu und R. Lauwerys (1987):
Assessment of urinary retinol-binding protein as an index of proximal tubular injury.
Clin. Chem. 33: 775-779.

Bernard, A. A., A. Vyskocil, P. Mahieu und R. Lauwerys (1988):
Effect of renal insufficiency on the concentration of free retinol-binding protein in urine
and serum.
Clin. Chem. Acta. 171: 85-93.

Biesalski H. K., G. Hafner, M. Gross und K. H. Bässler (1985):
Vitamin A in the serum of healthy probands and clinical groups.
Infusionsther. Klin. Ernähr. 12: 109-114.

Bindels, R. J. M. (1993):
Calcium handling by the mammalian kidney.
J. Exp. Biol. 184: 89-104.

Blaner, W. S.(1989):
Retinol-binding protein: The serum transport protein for vitamin A.
Endocr. Rev. 10: 308-316.

Blantz, R. C. (1980):
The glomerulus, passive filter or regulatory organ?
Klin. Wochenschr. 58: 957-964.

Blomhoff, R., P. Helgerud, M. Rasmussen, T. Berg und K. R. Norum (1982):
In vivo uptake of chylomicron [³H] retinyl ester by rat liver: Evidence for retinol transfer
from parenchymal to nonparenchymal cells.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79: 7326-7330.

Blomhoff, R., W. Eskild, G. M. Kindberg, K. Prydz und T. Berg (1985):
Intracellular transport of endocytosed chylomikron [³H] retinyl ester in rat liver
parenchymal cells.
J. Biol. Chem. 260: 13560-13570.

Blomhoff, R., M. H. Green, J. B. Green, T. Berg und K. R. Norum (1991):
Vitamin A metabolism: New perspective on absorption, transport, and storage.
Physiol. Rev. 71: 951-990.

Blomhoff, R. M. H. Green und K. R. Norum (1992):
Vitamin A physiological and biochemical processing.
Annu. Rev. Nutr. 12: 37-57.

Blomhoff, R. (1994):
Transport and metabolism of vitamin A.
Nutr. Rev. 52: 13-23.

Boesken, W. H., A. Mamier (1985):
Molekulargewichtsbezogene Urinprotein-Elektrophorese in der Diagnostik von
Nierenkrankheiten.
Lab. Med.9: 285-291.

Boesken, W. H., B. M. Oser (1993):
Rational diagnosis in kidney diseases.
Z. Ärztl. Fortbild. (Jena) 87: 211-215.

Bourdeau, J. E., M. B. Burg (1979):
Voltage dependence of calcium transport in the thick ascending limb of Henle's Loop.
Am. J. Physiol. 236: F357-F364.

Bourdeau, J. E., P. Lau (1990):
Basolateral cell membrane Ca-Na exchange in single rabbit connecting tubules.
J. Lab. Clin. Med.119:650-662.

Bourdeau, J. E. (1993):
Mechanisms and regulation of calcium transport in the nephron.
Semin. Nephron. 13: 191-201.

Bovee, K. C. (1984):
Clinical and laboratory evaluation of renal function.
In: Canine nephrology. Bovee, K. C. (Hrsg.):
Philadelphia, Harval Publishing Media, 219-233.

Brenner, B. M., T. W. Meyer und T. H. Hostetter (1982):
Dietary protein intake and the progressive nature of renal disease: The role
hemodynamically mediated glomerular injury in the pathogenesis of progressive
glomerular sclerosis in aging, renal ablation, and in intrinsic renal disease.
New Engl. J. Med. 307: 652-659.

Brenner, B. (1985):
Nephron adaptation to renal injury or ablation.
Amer. J. Physiol. 249: F234-F337.

Breitschwerdt, E. B., N. B. Oliver, G. K. King und M. M. Pavletic (1982):
Amer. Anim. Hosp. Ass. 18: 799.

Brown, D., J. A. Barsanti und W. A. Crowell (1985):
Gentamycin-associated acute renal failure in the dog.
J. Am. Vet. Med. Assoc. 186: 686-690.

Brown, D. (1994):
Canine renal disease. In: The Waltham book of clinical nutrition of the dog and cat.
Wills A., M. B. Simpson (Hrsg.): Oxford, 14-17.

Brown, S. A., W. A. Crowell, C. A. Brown, J. A. Barsanti und D. R. Finco (1997):
Pathophysiology and management of progressive renal disease.
Vet. J. 154: 93-109.

Buchholz, I., U. D. Wenzel und F. J. Schweigert (1993):
Bestimmung von Vitamin A im Blutplasma, in Geweben und im Harn von Nerzen mittels
HPLC und Photodiodenarray. In: 4. Symposium Vitamine und weitere Zusatzstoffe in
der Ernährung von Mensch und Tier. Flachowsky, G., F. Schöne, A. Hennig (Hrsg.):
Niederkeulen: Wissenschaftlicher Fachverlag Dr. Fleck, 48-53.

Büeler, M. R., F. Wiederkehr und D. J. Vonderschmitt (1995):
Electrophoretic, chromatographic and immunological studies of human urinary proteins.
Electrophoresis 16: 124-134.

Bulger, R. E., R. E. Cronin und D. C. Dobyan (1979):
Survey of the morphology of the dog kidney.
Anat. Rec. 194: 41-65.

Bulger, R. E., D. C. Dobyan (1982):
Recent advances in renal morphology.
Annu. Rev. Physiol. 44: 147-179.

Burg, M. B. (1982):
Thick ascending limb of Henle's loop.
Kidney Int. 22: 454-464.

Burgi, W., H. Kaufmann, H. F. Fehr und J. P. Muhlethaler (1985):
Chronic fatal vitamin A poisoning with hemolytic anemia.
Schweiz. Med. Wochenschr. 115: 526-528.

Burrows, R. (1977):
Herpes virus infections of animals - a brief review.
J. Antimicrob. Chemother. 3 Suppl. A: 9-14.

Carmichael, L. E. (1970):
Herpes virus canis: Aspects of pathogenesis and immune response.
J. Amer. Vet. Med. Assoc. 156: 1714-1721.

Catel, W. (1938):
Klinische und tierexperimentelle Studien über die normale und pathologische
Physiologie des A-Vitamins.
Monatsschr. Kinderheilkd. 73: 316-344.

Chew, D. J., S. P. DiBartola (1986):
Small animal nephrology and urology.
In: Manual of small animal nephrology and urology. Chew, D. J., S. P. DiBartola (Hrsg.):
London, Churchill Livingstone, 323-328.

Chmielewski, C. (1992):
Renal physiology series: Part 1 of 8. Renal anatomy and overview of nephron function.
ANNA. J. 19: 34-38.

Christensen, E. I., J. Glieman und S. K. Moestrup (1992):
Renal tubule gp330 is a calcium binding receptor for endocytic uptake of protein.
J. Histochem. Cytochem. 40: 1481-1490.

Christensen, E. I., H. Birn, P. Verroust und S. K. Moestrup (1998):
Membrane receptors for endocytosis in the renal proximal tubule.
Int. Rev. Cytol. 180: 230-284.

Christensen, E. I., J. O. Moskaug, H. Vorum, C. Jacobsen, T. E. Gundersen, A. Nykjaer, R. Blomhoff, T. E. Willnow und S. K. Moestrup (1999):
Evidence for an essential role of megalin in transepithelial transport of retinol.
J. Am. Soc. Nephrol. 10: 685-695.

Clausen, S., W. Baum, A. McCoord, J. Rydeen und B. Breese (1942):
The mobilization by alcohols of vitamin a from its stores in the tissue.
J. Nutr. 24: 1-14.

Cleave, A. J., P. W. Kent und A. R. Peacocke (1972):
The binding of hydrogen und calcium ions by Tamm-Horsfall glycoprotein.
Biochim. Biophys. Acta. 285: 208-223.

Collins, M. D., C. Eckhoff, W. Slikker, J. R. Bailey und H. Nau (1992):
Quantitative plasma disposition of retinol and retinyl esters after high-dose oral vitamin
A administration in the cynomolgus monkey.
Fundam. Appl. Toxicol. 19: 109-116.

Costello, C. B., B. Jasani und S. Kumar (1991):
Tamm-Horsfall protein in human renal tumours.
Anticancer Res. 11: 2159-2162.

Crowell, W. A., D. R. Finco (1974):
Frequency of pyelitis, pyelonephritis, renal perivasculitis, and renal infarction in dogs.
Am. J. Vet. Res. 36: 111-114.

Daniel, H., E. L. Morse und S. A. Adibi (1991):
The high und low affinity transport systems for dipeptides in kidney brush border membrane respond differently to alterations in pH gradient and membrane potential.
J. Biol. Chem. 266: 19917-19924.

Daniel, H. (1993):
Transport von Oligopeptiden an Bürstensaummembranen von Dünndarm und Nierentubulus.
Z. Gastroenterol. 33: 50-53.

Daniel, H., M. Herget (1997):
Cellular and molecule mechanisms of renal peptide transport.
Am J. Physiol. 273: F1-8.

Deetjen, P., W. Boylan und K. Kramer (1976):
In: Niere und Wasserhaushalt. Deetjen, P., W. Boylan und K. Kramer(Hrsg.):
München, Urban und Schwarzenberg Verlag, 3. Aufl., 112-117.

Dillon, S. C., G. M. Taylor und V. Shan (1998):
Diagnostic value of urinary retinol-binding protein in childhood nephrotic syndrome.
Pediatr. Nephrol. 12: 643-647.

DiStefano, A. M., M. Wittner, R. Nitschke, R. Braitsch, R. Greger, C. Bailly, C. Amiel, J. M. Elaouf, N. Roinel und C. De Rouffignac (1990):
Effects of parathyroid hormone und calcitonin on Na^+ , Cl^- , K^+ , Mg^{2+} and Ca^{2+} transport in cortical and medullary thick ascending limbs of mouse kidney.
Pfluegers Arch. 417: 161-167.

Dominguez, J. H., M. Juhaszova und H. A. Feister (1992):
The renal sodium-calcium exchanger.
J. Lab. Clin. Med. 119: 640-649.

Donaldson, M. D., R. E. Chambers, M. W. Woolridge und J. T. Whicher (1990):
Alpha 1-microglobulin, beta 2-microglobulin and retinol binding protein in childhood febrile illness and renal disease.
Pediatr. Nephrol. 4: 314-318.

Drenckhahn, D., R. P. Franke (1988):

Ultrastructural organisation of contractile and cytoskeletal proteins in glomerular podocytes of chicken, rat and man.

Lab. Invest. 59: 673-682.

Drumond, M. C., B. Kristal, B. D. Myers und W. M. Deen (1994):

Structural basis for reduced glomerular filtration capacity in nephrotic humans.

J. Clin. Invest. 94: 1187-1195.

Dunn, M. J., M. Simonson, E. W. Davidson, L. A. Scharschmidt und J. R. Sedor (1988):

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and renal function.

J. Pharmacol. 28: 524-529.

Dziukas, C.K., R. B. Stenzel, C. J. Hodson, J. R. Hoyer (1982):

Renal localization of Tamm-Horsfall protein in unilateral obstructive uropathy in rats.

Lab. Invest. 47: 185-193.

Eckhoff, C., M. D. Collins and H. Nau (1991):

Human plasma all-*trans*-, 13-*cis*- and 13-*cis*-4-oxoretinoic acid profiles during subchronic vitamin A supplementation: Comparison to retinol and retinyl ester plasma levels.

J.Nutr. 121: 1016-1025.

Elalouf, J. M., N. Roinel und C. De Rouffignac (1984):

ADH-like effects of calcitonin on electrolyte transport by Henle's loop of rat kidney.

Am. J. Physiol. 15: F 213-F 220.

Fidge, N. H., T. Shiratori, J. Ganguly und D. S. Goodman (1968):

Pathway of absorption of retinal und retinoic acid in the rat.

J. Lipid Res. 9: 103-109.

Finco, D. R., N. S. Stiles, S. K. Kneller, R. E. Lewis und R. B. Barrett (1971):

Radiologic estimation of kidney size of the dog.

J. Am. Vet. Med. Assoc. 159: 995-1002.

Finco, D. R., W. A. Crowell und J. A. Barsanti (1985):

Effects of three diets on dogs with induced chronic renal failure.

Am. J. Vet. Res. 46: 646.

Finco, D. R., D. Brown und W. A. Crowell (1992):
Effects of dietary phosphorus and protein in dogs with chronic renal failure.
Am. J. Vet. Res. 53: 2264.

Finco, D. R., S. A. Brown, C. A. Brown, W. A. Crowell, G. Sunfold und T. L. Cooper (1998):
Protein and calorie effects on progression of induced chronic renal failure in cats.
Am. J. Vet. Res. 59: 575-582.

Forssmann, W. G. (1973):
Ultrastruktur der Nephronen und Sammelrohre.
Anat. Anz. 134: 21-36.

Friedman, P. A., F. A. Gesek (1993):
Review: Calcium transport in renal epithelial cells.
Am. J. Physiol. 264: F 181-F 198.

Friedman, P. A., F. A. Gesek, P. Morley, J. F. Whitfield und G. E. Willick (1999):
Cell-specific signaling and structure-activity relations of parathyroid hormone analogs in mouse kidney cells.
Endocrinology 140: 301-309.

Frömter, E., K. Gessner (1974):
Free flow potential profile along rat kidney proximal tubule.
Pflugers Arch. 351: 69-84.

Gärtner, K. (1967):
Untersuchungen zur Verbreitung, Differentialdiagnostik, Ätiologie und Pathogenese der spontanen Nephritiden beim Hund unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Leptospireninfektionen.
Vet. Med. Habil. Schr. Goethe Universität, Frankfurt.

Gaethgens, G. (1937):
Über die Ausscheidung von Vitamin A in der Gravidität.
Klin. Wochenschr. 16: 52-53.

Galanti, L. M., J. Jamart, J. Dell'Omo und J. Donckier (1996):
Comparison of urinary excretion of albumin, alpha 1-microglobulin and retinol-binding protein in diabetic patients.
Diabetes Metab. 23: 118.

Ganapathy, V., F. H. Leibach (1983):
Role of pH gradient and membrane potential in dipeptide transport in intestinal and renal brush border membrane vesicles. Studies with glycyl-L-proline and L-carnosine.
J. Biol. Chem. 258: 189-192.

Ganapathy, V., Y. Miyamoto und F. H. Leibach (1987):
Driving force for peptide transport in mammalian kidney and intestine.
Contrib. Infusion Ther. Clin. Nutr. 17: 54-6.

Ganguly, J., P. S. Sastry (1985):
Mechanism of conversion of beta-carotene into vitamin-A-central cleavage versus random cleavage.
World Rev. Nutr. Diet. 45: 199-220.

Gekle, M. (1998):
Renal proximal tubular albumin reabsorption: Daily prevention of albuminuria.
News Physiol. Sci. 13: 5-11.

Gerlach, T., H. K. Biesalski und K. H. Bässler (1988):
Serum Vitamin-A-Bestimmungen und ihre Aussagekraft zum Vitamin-A-Status.
Z. Ernährungswiss. 27: 57-70.

Gerlach, T., M. H. Zile (1990)
Upregulation of serum retinol in experimental acute renal failure
FASEB. J. 4: 2511-2517.

Gerlach, T., M. H. Zile (1991a):
Effect of retinoic acid and apo-RBP on serum retinol concentration in acute renal failure.
FASEB. J. 5: 86-92.

- Gerlach, T., M. H. Zile (1991b):
Metabolism and secretion of retinol transport complex in acute renal failure.
J. Lipid. Res. 32: 515- 520.
- Giguere, V., E. S. Ong, P. Segui und R. M. Evans (1987):
Identification of a receptor for the morphogen retinoic acid.
Nature 330: 624-629.
- Godovac-Zimmermann, J. (1988):
The structural motif of beta-lactoglobulin and retinol-binding protein: a basic framework
for binding and transport small hydrophobic molecules.
Trends Biochem. Sci. 13: 64-66.
- Gokhale, J. A., M. D. McKee und S. R. Khan (1996):
Immunocytochemical localization of Tamm-Horsfall protein in the kidneys of normal and
nephrolithic rats.
Urol. Res. 24: 201-209.
- Gokhale, J. A., P. A. Glenton und S. R. Khan (1997):
Biochemical and quantitative analysis of Tamm Horsfall protein in rats.
Urol. Res. 25: 347-354.
- Goodman, D. S., H. S. Huang, M. Kanai und T. Shiratori (1967):
The enzymatic conversion of all-*trans*- β -carotene into retinal.
J. Biol. Chem. 242: 2543-3554.
- Goonasekera, C. D., V. Shah und M. J. Dillon (1996):
Tubular proteinuria in reflux nephropathy: post ureteric re-implantation.
Pediatr. Nephrol. 10: 559-563.
- Grapetin, K. (1968):
Prostataveränderungen und ihre Beziehung zu krankhaften Prozessen des
Harnapparates beim Hund.
Vet. Med. Diss., Berlin.

Grases, F., R. Garcia-Gonzalez, J. J. Torres, A. Llobera (1998):
Effects of phytic acid on renal stone formation in rats.
Scand. J. Urol. Nephrol. 32: 261-265.

Grauer, G. F., C. A. Culham, R. R. Dubielzkij, S. C. Longhofer, R. B. Grieve (1989):
Experimental *Dirofilaria immitis*-associated glomerulonephritis induced in part by in situ
formation of immune complexes in the glomerular capillary wall.
J. Parasitol. 75: 585-593.

Grauer, G.F. (1992):
Glomerulonephritis.
Semin. Vet. Med. Surg. (Small Anim) 7: 187-197.

Grauer, G.F., D. S. Greco und E. N. Behrend (1994):
Effects of dietary protein conditioning on gentamicin-induced nephrotoxicosis in healthy
male dogs.
Am. J. Vet. Res. 55:90-97.

Grauer, G.F., S. P. DiBartola (1995):
Glomerular disease. In: Textbook of veterinary internal medicine,
Ettinger, S. J., E. C. Feldman (Hrsg.):
Philadelphia, W. B. Saunders, ed 4, 1766-74.

Grauer, G.F., I. F. Lane (1995):
Acute renal failure. In: Textbook of veterinary internal medicine.
Ettinger, S. J., E. C. Feldman (Hrsg.):
Philadelphia, W. B. Saunders, ed 4, 1720-1733.

Grauer, G.F. (1998):
Urinary tract disorders. In: Small animal internal medicine.
Nelson, R. W., G. G. Couto (Hrsg.):
Davis, Mosby, ed. 2, 571-669.

Green, M. H., L. Uhl und J. B. Green (1985):
A multicompartimental model of vitamin A kinetics in rats with marginal liver vitamin A
stores.
J. Lipid Res. 26: 806-818.

Green, M. H., J. B. Green (1994):

Dynamics and control of plasma retinol. In: Vitamin A in health and disease.

Blomhoff, R., M. Decker (Hrsg.): New York, Decker, 119-133.

Greger, R. (1985):

Ion transport mechanisms in thick ascending limb of Henle's loop of mammalian nephron.

Physiol. Rev. 65: 760-797.

Gunther, G. W. (1937):

Die Papillennekrosen der Niere bei Diabetes.

Münch. Med. Wochenschr. 84: 1695.

Haddad, J. G. (1995):

Plasma vitamin D-binding protein (Gc-globulin): multiple tasks.

J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 53: 579-582.

Ham, K. N., J. D. Tange (1969):

Some experimental observations relating to the pathogenesis of renal papillary necrosis.

Australas. Ann. Med. 18: 199-208.

Hamlyn, J. M., J. H. Ludens (1992):

Nonatrial natriuretic hormones. In: The kidney: Physiology and pathophysiology.

Seldin, D. W., G. Giebisch (Hrsg.): New York,

Williams and Wilkins Publishers, ed 2, 1852-1925.

Harrison, E. H., M. Z. Gad (1989):

Hydrolysis of retinyl palmitate by enzymes of rat pancreas and liver.

J. Biol. Chem. 264: 17142-17147.

Hession, C., J. M. Decker, A. P. Sherblom, S. Kumar, C. C. Yue, R. J. Mattaliano, R.

Tizard, E. Kawashima, U. Schmeissner und S. Heletky (1987):

Uromodulin (Tamm-Horsfall glycoprotein): a renal ligand for lymphokines.

Science 237: 1479-1484.

Heukeshoven, J., R. Dernick (1986):

SDS-Polyacrylamid-Elektrophorese: Coomassie- und Silberfärbung.

In: Elektrophorese-Praktikum. R. Westermann (Hrsg.):

Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 182.

Heywood R. (1967):

Vitamin A in the liver and kidney of some felidae.

Brit. Vet. J. 123: 390-396.

Hierholzer, K., M. Fromm (1987):

Wasser- und Elektrolythaushalt; Physiologie der Niere. In: Lehrbuch der Veterinärphysiologie. Scheunert, A., Trautmann, A. (Hrsg):

Berlin, Verlag Paul Parey, 7. Aufl., 359-436.

Hierholzer, K., H. Siebe und M. Fromm (1990):

Inhibition of 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase and its effect on epithelial sodium transport.

Kidney Int. 38, 673-678.

Hjälms, G., E. Murray, G. Crumley, W. Harazin, S. Lundgren, I. Onyango, B. Ek, M. Larsson, C. Juhlien, P. Hellman, H. Davis, G. Akerström, L. Rask und B. Mose (1996):

Cloning and sequencing of human gp 330, a Ca^{2+} binding receptor with potential intracellular signaling properties.

Eur. J. Biochem. 239: 132-137.

Hörauf, A., C. Reusch und G. Minkus (1989):

Vergleich von Nierenbiopsie und SDS-Polyacrylamidgel-Elektrophorese (SDS-PAGE) bei der Katze.

Tierärztl. Prax. Suppl. 5: 29-32.

Hollander, D., K. S. Muralidhara (1977):

Vitamin A1 intestinal absorption: Influence of luminal factors on transport.

Am J. Physiol. 232: E 471-E 477.

Hollander, D., P. E. Ruble (1978):

Beta-carotene intestinal absorption: bile, fatty acid, pH, and flow rate effects on transport.

Am. J. Physiol. 123: 693-700.

Hostetter, T. H., J. L. Olson, H. G. Rennke, M. A. Venkatachala and B. N. Brenner (1981):

Hyperfiltration in remnant nephron: The potentially adverse response to renal ablation.

Amer. J. Physiol. 241: F 85-F 93.

Hostetter, T. H., H. G. Rennke and B. M. Brenner (1982):

The case for intrarenal hypertension in the initiation and progression of diabetic and other glomerulopathies.

Amer. J. Med. 72: 375-380.

Howie, A. J., N. Smithson, F. Raofat (1993):

Distinctive patterns of renal neoplasms containing Tamm-Horsfall protein.

Virchows Arch. A. Pathol. Histopathol. 422: 361-365.

Hoyer, J. R., Resnick, Michael and R. L. Vernier (1974):

Ontogeny of Tamm-Horsfall urinary glycoprotein.

Lab. Invest. 30: 757-761.

Hoyer, J. R., M. W. Seiler (1979):

Pathophysiology of Tamm-Horsfall protein.

Kidney Int. 16: 279-289.

Hoyer, J. R., S. P. Sisson and R. L. Vernier (1979):

Tamm-Horsfall glycoprotein. Ultrastructural immunoperoxidase localization in rat kidney.

Lab. Invest. 41, 168-173.

Hunt, J. S., A. R. McGiven, A. Groufsky, K. L. Lynn and M. C. Taylor (1985):

Affinity-purified antibodies of defined specificity for use in a solid-phase microplate radioimmunoassay of human Tamm-Horsfall glycoprotein in urine.

Biochem. J. 227: 957-963.

Hurov L., E. W. Ellett und P. J. O'Hara (1966):

Bilateral hydronephrosis resulting from a transitional epithelial carcinoma in dogs.
J. Am. Vet. Med. Ass. 149: 412-417.

Hussain M. M., R. W. Mahley, J. K. Boyles, M. Fainaru, W. J. Brecht und P. A. Lindquist (1989 a):

Chylomikron remnant clearance by liver and bone marrow in rabbits. Factors that modify tissue-specific uptake.

J. Biol. Chem. 264: 9571-9582.

Hussain M. M., R. W. Mahley, J. K. Boyles, P. A. Lindquist, W. J. Brecht und T. L. Innerarity (1989 b):

Chylomikron metabolism. Chylomicron uptake by bone marrow in different animal species.

J. Biol. Chem. 264: 17931-17938.

Idasiak-Piechocka, I., M. Krzymanski (1996):

The role of tubulointerstitial changes in progression of kidney function failure in patients with chronic glomerulonephritis.

Przegl. Lek. 53: 43-53.

Israele, V., A. Darabi und G. H. McCracken (1987):

The role of bacterial virulence factors and Tamm-Horsfall protein in the pathogenesis of *Escherichia coli* urinary tract in infants.

Am. J. Dis. Child. 141: 1230-1234.

Jaconi, S., J. H. Saurat und G. Siegenthaler (1996):

Analysis of normal and truncated holo- and apo-retinol-binding protein (RBP) in human serum: altered ratios in chronic renal failure.

Eur. J. Endocrinol. 134: 576-582.

Johnston, J. H. (1969):

The pathogenesis of hydronephrosis in children.

Brit. J. Urol. 41: 724.

Jordao Junior, A. A., J. F. Figueiredo, S. Silveira, M. V. Junqueira-Franco und H. Vanucchi (1998):
Urinary excretion of vitamin A and thiobarbituric acid reactive substances in AIDS patients.
Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. Sao Paulo 53: 11-15.

Kato, M., M. Kanai, M. Kameko, S. Ohno, Y. Fujii und T. Nagata (1982):
Localization of retinol-binding protein and prealbumin in the human kidney with an unlabeled immunohistochemical method.
Acta Histochem. Cytochem. 15: 68-75.

Kato, M., K. Kato und D. S. Goodman (1984):
Immunocytochemical studies on the localization of plasma and cellular retinol-binding protein and transthyretin (prealbumin) in rat liver and kidney.
J. Cell. Biol. 98: 1696-1704.

Kerjaschki D., L. Noronha-Blob, B. Sacktor und M. G. Farquhar (1984):
Microdomains of distinctive glycoprotein composition in the kidney proximal tubule brush border.
J. Cell. Biol. 98: 1505-1513.

Kinne, R. (1991):
Selectivity and direction: Plasma membranes in renal transport.
Am. J. Physiol. 260: 153-162.

Knottenbelt, D. C., M. K. Knottenbelt, J. Moulton und F. W. Hill (1988):
Unilateral hydronephrosis in a dog.
Aust. Vet. J. 65 : 400-402.

Kokko, J. P. und M. Baum (1992):
Effects of protein kinase C activation on sodium, potassium, chloride, and Total C_{O_2} transport in the rabbit cortical collecting tubule.
J. Clin. Invest. 80: 1561-1570.

Kraft, W., U. M. Dürr, M. Fürll, H. Bostedt und K. Heinritzi (1999):
Harnapparat. In: Klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin. Kraft, W., U. M. Dürr (Hrsg.): Stuttgart, Schattauer Verlag, 5. Auflage, 169-200.

Krinsky, N. I., M. D. Russett, G. J. Handelman und D. M. Snodderly (1990):
Structural and geometrical isomers of carotenoids in human plasma.
J. Nutr. 120: 1654-1662.

Kriz, W. E., L. Bankir (1988):
A standart nomenclature for structures of the kidney.
Anat. Embryol. (Berl.), 178: N 1-N 8.

Kriz, W., E. Hackenthal, R. Nobiling, T. Sakai und M. Elger (1994):
The role of podocytes to counteract capillary wall distension.
Kidney. Int. 45:369-376.

Kumar, S., B. Jasani, J. S. Hunt, D. B. Moffat und A. W. Asscher (1985):
A system for accurate immunolocalization of Tamm-Horsfall protein in renal biopsies.
Histochem. J. 17: 1251-1258.

Kumar, S., H. B. Marsden, B. Jasani und P. Kumar (1987):
Study of childhood renal tumours using a monoclonal antibody to Tamm-Horsfall
protein.
J. Clin. Pathol. 40: 1456-1462.

Kumar, S. und A. V. Muchmore (1990):
Tamm-Horsfall protein-uromodulin (1950-1990)
Kidney Int. 37: 1395-1401.

Kumar, R. (1991):
Vitamin D und calcium transport.
Kidney Int. 40: 1177-1189.

Kurokawa, K., M. Fukagawa, M. Hayashi und T. Saruta (1992):
Renal receptors und cellular mechanisms of hormone action in the kidney.
In: The kidney: Physiology and pathophysiology. Seldin, D., G. Giebisch (Hrsg.):
New York, Raven Press, ed. 2, 1339-1374.

Laemmli, U. (1970):
Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4.
Nature 227: 680-685.

- Lambert, W. E., A. P. De Leenheer (1985):
Demonstration of retinoic acid isomers in human urine under physiological conditions.
Experientia 41: 359-360.
- Lawrie, N. R., T. Moore und K. R. Rajagopal (1941):
The excretion of vitamin A in urine.
Biochem. J. 35: 825-836.
- Lehste, J. R., B. Rolinski, H. Vorum, J. Hilpert, A. Nykjaer, C. Jacobsen, P. Aucouturier, J. O. Moskaug, A. Otto, E. I. Christensen und T. E. Wilnow (1999):
Megalin knockout mice as an animal model of low molecular weight proteinuria.
Am. J. Pathol. 155: 1361-1370.
- Leicht, E., J. Strunz, H. B. Von Seebach, R. J. Meiser und E. Mausle (1973):
Acute vitamin A intoxication with hemolytic anemia, hypercalcemia and toxic hepatitis.
Med. Klin. 68: 54-59.
- Leopold-Temmler, B., I. Nolte (1993)
Diagnose transienter renaler Störungen mit der SDS-Urinelektrophorese am Beispiel der Endometritis-Pyometra-Erkrankung der Hündin.
Mh. Vet. Med. 48: 531-536.
- Lindemann, F., H. G. Preuss (1986):
Renal physiology and pathophysiology of aging. In Michelis, S., F. Davis, H. G. Preuss (Hrsg.): *Geriatric nephrology*. New York, Field und Rich, 5-9.
- Lotan, R. (1996):
Retinoids in cancer chemoprevention.
FASEB J. 10: 1031-1039.
- MacDonald, P. N., D. E. Ong (1987):
Binding specificities of cellular retinol-binding protein and cellular retinol-binding protein, type II.
J. Biol. Chem. 262: 10550-10556.

MacDonald, P. N., D. Bok und D. E. Ong (1990):
Localization of cellular retinol-binding protein and retinol-binding protein in cells
comprising the blood-brain barrier of rat.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87: 4265-4269.

MacDougall, D. F., T. Cook, A. P. Steward und V. Cattell (1986):
Canine chronic renal disease: prevalence and types of glomerulonephritis in the dog.
Kidney. Int. 29: 1144-1151.

Maddock, C. L., S. B. Wolbach und S. Maddock (1949):
Hypervitaminosis A in the dog.
J. Nutr. 39: 117-132.

Maddox, D. A., B. M. Brenner (1991):
Glomerular ultrafiltration. In: The kidney. Brenner, B.M., F. C. Rector (Hrsg.):
Philadelphia, Saunders, ed. 4, 205-244.

Maden, M. (1983):
The effect of vitamin A on the regenerating axolotl limb.
J. Embryol. Exp. Morphol. 77: 273-295.

Maden, M. (1994):
Vitamin a in embryonic development.
Nutr. Rev. 52: 3-12.

Madewell, B. R., J. E. Creed und J. B. Hopkins (1975):
Hydronephrosis and pyelonephritis in a dog.
J. Vet. Med. Assoc. 167: 377-379.

Mahoney, C. P., M. T. Margolis, T. A. Knauss and R. F. Labbe (1980):
Chronic vitamin A intoxication in infants fed with chicken liver.
Pediatrics 65: 893-896.

Makover, A., D. R. Soprano, M. L. Wyatt und D.S. Goodman (1989):
Localization of retinol-binding protein messenger RNA in the rat kidney and in
perinephric fat tissue.
J. Lipid. Res. 30: 171-180.

Malagolini, N., D. Cavallone und F. Serafini-Cessi (1997):
Intracellular transport, cell-surface exposure and release of recombinant Tamm-Horsfall glycoprotein.
Kidney Int. 52: 1340-1350.

Mallia, A. K., J. E. Smith und D. S. Goodman (1975):
Metabolism of retinol-binding protein and vitamin A during hypervitaminosis A in the rat.
J. Lipid. Res. 16: 180-188.

Mallory, G. K., A. R. Crain und J. E. Edwards (1940):
Pathology of acute and of field experimental pyelonephritis.
Arch. Path. 30: 330-339.

McCaa, R. E., J. E. Hall und C. S. McCaa (1978):
The effects of angiotensin 1-converting enzyme inhibitor on arterial blood pressure and urinary sodium excretion. Role of renal renin-angiotensin and kallikrein-kinin systems.
Circ Res 43: 1 32-39.

McGiven, A. R., J. S. Hunt, W. A. Day und R. R. Bailey (1978):
Tamm-Horsfall protein in the glomerular capsular space.
J. Clin. Pathol. 31: 620-625.

McKenzie, J. K., R. Patel und E. G. McQueen (1964):
The excretion rate of Tamm-Horsfall urinary mucoprotein in normals and in patients with renal disease.
Aust. Ann. Med. 13: 32-39.

McKenzie, J. K., E. G. McQueen (1969):
Immunofluorescent localization of Tamm-Horsfall mucoprotein in human kidney.
J. Clin. Pathol. 22: 334.

McQueen, E. G., G. B. Engle (1966):
Factors determining the aggregation of urinary mucoprotein.
J. Clin. Pathol. 19: 392-396.

Meadows, R. (1973):

Glomerulonephritis with fibrin and crescent formation.

Perspect. Nephrol. Hypertens. 2: 695-710.

Meyer-Lindenberg, A., P. Wohlsein, G. Trautwein und I. Nolte (1997):

Urinproteinanalyse mit Natrium-Dodecyl-Sulfat-Polyacrylamid-Gradientengel-Elektrophorese (SDS-PAGE) bei gesunden und nierenkranken Katzen.

J. Vet. Med. A 44: 39-54.

Michel, A., G. Smollich (1992):

Das Harnsystem. In: Mikroskopische Anatomie der Haustiere. Smollich, G. (Hrsg.):

Jena, Stuttgart, 2. Auflage, Gustav Fischer, 213-232.

Michell, A. R. (1988):

Diuretics and cardiovascular disease.

J. Vet. Pharmacol. Ther. 11:246-253.

Mitra, A. K., J. O. Alvarez, L. Guay-Woodford, G. J. Fuchs, M. A. Wahed und

C. B. Stephensen (1998):

Urinary retinol excretion and kidney function in children with shigellosis.

Am. J. Clin. Nutr. 68: 1095-1103.

Miyake, O., T. Yoshioka, K. Yoshimura, M. Honda, S. Yamaguchi, T. Koide und A.

Okuyama (1998):

Expression of Tamm-Horsfall protein in stone-forming rat model.

Br. J. Urol. 81: 14-19.

Morelle, W., S. M. Haslam, M. Ziak, J. Roth, H. R. Morris und A. Dell (2000):

Characterisation of the N-linked oligosaccharides of megalin (gp330) from rat kidney.

Glycobiology 10: 295-304.

Morris, E. R., D. A. Rees (1978):

Principles of biopolymer gelation, possible models of mucus gel structure.

Br. Med. Bull. 34: 49-53.

Morris-Kay, G. M., N. Soklova (1996):
Embryonic development and pattern formation.
FASEB J. 10: 961-968.

Muchmore, A. V., J. M. Decker (1985):
Uromodulin: A unique immunosuppressive glycoprotein isolated from the urine of pregnant women.
Science 229: 479.

Muchmore, A. V. (1986):
Uromodulin: An immunoregulatory glycoprotein isolated from pregnancy urine that binds to and regulates the activities of interleukin 1.
Am. J. Reprod. Immunol. Mikrobiol. 11: 89-93.

Muchmore, A., J. M. Decker (1987):
Evidence that recombinant IL-1 α exhibits lectin-like specificity and binds to homogeneous uromodulin via N-linked oligosaccharides.
J. Immunol. 138: 2541-2546.

Müller-Peddinghaus, R., B. Schaefer, U. Greiffenhagen, W. Wirth und G. Trautwein (1976):
Beitrag zur Pathologie, Klinik und Ätiologie der Glomerulonephritis und interstitiellen Nephritis des Hundes.
Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr., 89:7-11.

Müller-Peddinghaus, R., G. Kirpal, B. Schaefer und G. Trautwein (1977):
Untersuchungen über die Pyelonephritis des Hundes.
Zentralbl. Veterinärmed. (B), 24: 198-217.

Müller-Peddinghaus, R., G. Trautwein (1977a):
Spontaneous glomerulonephritis in dogs. I. Classification and immunopathology.
Vet. Pathol. 14: 1-13.

Müller-Peddinghaus, R., G. Trautwein (1977b):
Spontaneous glomerulonephritis in dogs. II. Correlation of Glomerulonephritis with age, chronic interstitial nephritis and extrarenal lesions. Vet. Pathol. 14: 121-127.

- Müller-Peddinghaus, R., G. Trautwein (1978):
Differenzierung von Proteinurien mittels SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese.
Fortschr. Vet. Med. 28: 292-301.
- Mundel, P., W. Kriz (1995):
Structure and function of podocytes: An update.
Anat. Embryol. (Berl.) 192: 385-397.
- Mundel, P., S. J. Shankland (1999):
Glomerular podocytes and adhesive interaction with glomerular basement membrane.
Exp. Nephrol., 7: 160-166.
- Mydlik, M., K. Derzsiova, M. Bratova und S. Havris (1991):
Serum vitamin A, retinyl esters and vitamin E in nephrotic syndrome.
Int. Urol. Nephrol., 23: 399-405.
- Myers, C. E., R. E. Bulger, C. C. Tisher und B. F. Trump (1966):
Human renal ultrastructure: 4. Collecting duct of healthy individual,
Lab. Invest., 15: 1921-1950.
- Naasani, I., M. Sugawara, M. Kobayashi, K. Iseki und Miyazaki (1995):
Transport mechanism of ceftibuten, a dianionic cephem, in rat renal brush border
membrane. Pharm. Res. 12: 605-608.
- Nagy, N. E., K. B. Holven, N. Roos, H. Senoo, N. Kojima, K. Norum und R. Blomhoff
(1997):
Storage of vitamin A in extrahepatic stellate cells in normal rats.
J. Lipid. Res. 38: 645-658.
- Napoli, J. L., E. P. Pacia und G. J. Salerno (1998):
Cholate effects on all-trans-retinyl palmitate hydrolysis in tissues homogenates:
Solubilization of multiple kidney membrane hydrolases.
Arch. Biochem. Biophys. 274: 192-199.
- Neßelhut, T., W. Rath, M. H. Weber und W. Kuhn (1989):
Veränderungen der Tamm-Horsfall-Proteinausscheidung im Urin von Patientinnen mit
Schwangerschaftshypertonie. Klin. Wochenschr. 67, Suppl. XVII: 11-13.

Nickel, R., A. Schummer und E. Seiferle (1995):
Harn- und Geschlechtsapparat. In: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, Band II.
Nickel, R., A. Schummer und E. Seiferle (Hrsg.):
Berlin und Hamburg, Verlag Paul Parey, 6. Auflage, 300-326.

Noy, N., Z.-J. Xu (1990):
Interactions of retinol with binding proteins: Implication for the mechanism of uptake by cells.
Biochemistry 29: 3878-3883.

Noy, N., W. S. Blaner (1991):
Interactions of retinol with binding proteins: Studies with rat cellular retinol-binding protein and with rat retinol-binding protein.
Biochemistry 30: 6380-6386.

Nykjaer, A., D. Dragun, D. Walther, H. Vorum, C. Jacobsen und J. Herz (1999):
An endocytic pathway essential for renal uptake and activation of the steroid 25(OH) vitamin D3.
Cell 96: 507-515.

O'Connor, W. J. (1984):
Tubular reabsorption in normal renal function;
Renal Physiol; 7: 193-204.

Oliver, P. (1944):
New directions in renal morphology: a method, its results and its future.
Harvey Lect., 40, 102.

Olson, J. A., O. Hayaishi (1965):
The enzymatic cleavage of β -carotene into vitamin A by soluble enzymes of rat liver and intestine.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 54: 1364-1370.

Olson, J. A. (1994):
Serum levels of vitamin A and carotinoids as reflectors of nutritional status.
J. Natl. Cancer Inst. 73: 1439-1444.

Ong, D. E., B. Kakkad und P. N. MacDonald (1987):
Acyl-CoA-independent esterification of retinol bound to cellular retinol-binding protein (type II) by microsomes from rat small intestine.
J. Biol. Chem. 262: 2729-2736.

Osborne, C. A., O. G. Low und D. R. Finco (1972):
Canine and feline urology. W. B. Saunders, Philadelphia.

Osborne, C. A., J. S. Klausner, D. R. Krawiec und D. P. Griffith (1981):
Canine struvite urolithiasis: Problems und their dissolution.
J. Am. Vet. Assoc. 179: 239-244.

Osgood, R. W., M. Patton, M. J. Hanley, M. Venkatachalam, H. J. Reineck und J. H. Stein (1983):
In vitro perfusion of the isolated dog glomerulus.
Am J Physiol 244: F 349-F 354.

Papanikolaou, G., A. J. Arnold und A. J. Howie (1995):
Tamm-Horsfall protein in reflux nephropathy.
Scand. J. Urol. Nephrol. 29: 141-146.

Patel, R., J. L. McKenzie und E. G. McQueen (1964):
Tamm-Horsfall urinary mucoprotein and tubular obstruction by casts in acute renal failurLancet. 1: 457-461.

Pavenstädt, H. (2000):
Roles of the podocyte in glomerular function.
Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 278: F 173-F 179.

Peach, R. J., W. A. Day, P. J. Ellingsen und A. R. McGiven (1988):
Ultrastructural localization of Tamm-Horsfall protein in human kidney using immunogold electron microscopy.
Histochem. J. 20: 156-166.

Pennica, D., W. J. Kohr, W.-J. Kuang, D. Glaister, B. B. Aggarwal, E. Y. Chen und D. V. Goeddel (1987):
Identification of human uromodulin as the Tamm-Horsfall urinary glycoprotein.
Science 236: 83-88.

Peraino, R. A., W. N. Suki (1982):
Divalent cation transport in isolated tubules.
Kidney Int. 22: 492-497.

Petkovitch, M., N. J. Brand, A. Kruhst und P. A. Chambon (1987):
A human retinoic acid receptor which belongs to the family of nuclear receptors.
Nature 330: 444-450.

Pfeffer, B. A., V. M. Clark, J. G. Flannery und D. Bok (1986):
Membrane receptors for retinol-binding protein in cultured human retinal pigment epithelium.
Invest. Ophthalmol. Vis. Res. Sci. 27: 1031-1040.

Polzin, D. J., C. A. Osborne, L. D. Adams und T. D. O' Brien (1989):
Dietary management of canine and feline chronic renal failure.
Vet. Clin. North. Am. Small Anim. Pract. 19(3): 539-560.

Pospischil, A. (1981):
Diagnosis of canine herpes virus infection.
Berl. Münch. Tierärztl. Wochenschr. 94:296-298.

Preuss, H. G., S. J. Podlasek und J. B. Henry (1991):
Evaluation of renal function and water, electrolyte, and acid-base balance.
In: Clinical Diagnosis and Methodology. Henry, J. B. (Hrsg.):
Philadelphia, W. B. Saunders, 119-137.

Preuss, H. G. (1993):
Basics of renal anatomy and physiology. Clin. Lab. Med. 13: 1-11.

Raica, N. J., J. Scott, L. Lowry und H. E. Sauberlich (1972):
Vitamin A concentrations in human tissues collected from five areas in the United States.

Am. J. Clin. Nutr. 25: 291-296.

Raila, J. (1999):

Untersuchungen zur Ausscheidung von Vitamin A im Harn von Caniden.
Diss. Med. Vet. Leipzig.

Raila, J. U. Neumann, F. J. Schweigert (2003):

Immunocytochemical localization of megalin, retinol-binding protein and Tamm-Horsfall glycoprotein in the kidney of dogs.
Vet. Res. Commun. 27: 125-135.

Raychowdhury, R., J. L. Niles, R. T. McClusky und J. A. Smith (1989):

Autoimmun target in Heymann nephritis is a glycoprotein with homology to the LDL receptor.
Science 244: 1163-1165.

Rector, F. C. (1983):

Sodium, bicarbonate, and chloride absorption by the proximal tubule.
Am. J. Physiol. 244: F 461-F 471.

Reinacher, M., K. Frese (1991):

Untersuchungen zur Glomerulonephritis bei Hund und Katze.
Tierärztl. Prax. 19: 175-180.

Renk, W. (1971):

Beziehungen von Veränderungen der Prostata und Metritiden zu den Entzündungen des Harnapparates beim Hund. Beitrag zur Pathogenese der Pyelonephritis.
Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. 84, 281-286.

Renk, W. (1972):

Leptospirose beim Hund.
Kleintier Praxis 17: 153-162.

Rerat, A., C. Simoes-Nunes, M. P. Vaissade und P. Vaugelade (1992):

Splanchnic fluxes of amino acids after duodenal infusion of carbohydrate solutions containing free amino acids or oligopeptides in the non anaesthetized pig.
Br. J. Nutr. 68: 111-138.

Resnick, J. S., S. Sisson und R. L. Vernier (1978):
Tamm-Horsfall protein. Abnormal localization in renal disease.
Lab. Invest. 38: 550-555.

Reusch, C., M. Liehs, A. Hörauf, J. Lechner, G. Minkus, G. Brem, G. Leuterer,
W. Herrmanns und W. Kraft (1991):
Erste Mitteilung über ein gehäuftes Auftreten von Glomerulonephritis bei jungen Berner
Sennenhunden.
Tierärztl. Prax. 19: 181-182.

Ribaya-Mercado, J. D., M. C. Blanco, J. G. Fox und R. M. Russell (1994):
High concentrations of vitamin A esters circulate primarily as retinyl stearate and are
stored promarily as retinyl palmitate in ferret tissues.
J. Am. Coll. Nutr. 13: 83-86.

Richter, J. (1964a):
Über die Ausscheidung von Vitamin A im Urin bei Kindern.
Diss. Med. Berlin.

Richter, J. (1964b):
Über die Ausscheidung von Vitamin A im Urin während der Gravidität.
Z. Geburtsh. Gynäkol. 162:206-211.

Ries, M., U. Wenzel und H. Daniel (1994):
Transport of cefadroxil in kidney brush border membranes is mediated by two
electrogenic H⁺-coupled transport system
J. Pharmacol. Exp. Ther. 271: 1327-1333.

Rindler, M. J., S. S. Naik, N. Li, T. C. Hoops und M.-N. Peraldi (1990):
Uromodulin (Tamm-Horsfall glycoprotein/Uromucoid) is a phosphatidylinositol-
linked membrane proteine.
J. Biol. Chem. 265: 20784-20789.

Rivers, B. J., P. A. Walter und T. D. O'Brien (1996):
Evaluation of urine gammaglutamyl transpeptidase-to-creatinine ratio as a diagnostic
tool in an experimental model of aminoglycoside-induced acute renal failure in the dog.
J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 32: 323.

- Rohde, R., P. Deetjen (1968):
Die Glukoseresorption in der Rattenniere.
Pflügers Arch 302: 219-232.
- Ross, A. C. (1981):
Separation of long-chain fatty acid esters of retinol by high-performance liquid chromatography.
Anal. Biochem. 115: 324-330.
- De Rouffignac, C., B. Corman und N. Roinel (1983):
Stimulation by antidiuretic hormone of electrolyte tubular reabsorption in rat kidney.
Am. J. Physiol. 244: 156-164.
- Ruotolo, G., H. Zhang, V. Bentsianov und N. A. Le (1992):
Protocol for the study of the metabolism of retinyl esters in plasma lipoproteins during postprandial lipemia.
J. Lipid. Res. 33: 1541-1549.
- Saito A., S., Pietromonaco, A. K. Loo und M. G. Farquhar (1994):
Complete cloning und sequencing of rat gp 330/ megalin, a distinctive member of the low density lipoprotein receptor gene family.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91: 9725-9729.
- Sandersleben, J., K. Dämmrich und E. Dahme (1989):
Harnorgane. In: Pathologische Histologie der Haustiere.
Sandersleben, J., K. Dämmrich und E. Dahme (Hrsg.):
Stuttgart, Enke Verlag, 3. Auflage, 142-145.
- Scarpioni, L., P. P. Dall'aglio, P. G. Poietti und C. Buzio (1976):
Retinol binding protein in serum und in urine of glomerular tubular nephropathies.
Clin. Chim. Acta. 68: 107-113.
- Schenk, E. A., R. H. Schwartz und R. A. Lewis (1971):
Tamm-Horsfall mucoprotein. Localization in the kidney.
Lab. Invest. 25: 92.

De Schepper, J., J. van der Stock, E. Capiou und I. De Cock (1987):
Renal injury in dogs with pyometra.
Tijdschr. Diergeneeskd. 112 Suppl. 1: 124S-126S.

Schiwara, H. W., A. Spiller (1989):
Differentiation of renal and postrenal hematuria and proteinuria with SDS
polyacrylamide gel electrophoresis and immunoblotting.
Klin. Wochenschr. 67: 14-18.

Schnermann, J. (1980):
Niere und Wasserhaushalt.
In: Arbeitsbuch Physiologie. Kramer (Hrsg.):
München, Urban und Fischer Verlag, 3. Aufl., 365-432.

Schweigert, F. J. (1988):
Insensitivity of dogs to the effects of nonspecific bound vitamin A in plasma.
Int. J. Vitam. Nutr. Res. 58: 23-25.

Schweigert, F. J., S. Uehlein-Harrell (1989):
Diagnostische Bedeutung Lipoprotein-gebundener Vitamin-A-Ester im Blutplasma von
Karnivoren.
Tierärztl. Prax. Suppl. 5: 78-80.

Schweigert, F. J., O. A. Ryder, W. A. Rambeck und H. Zucker (1990a):
The majority of vitamin A is transported as retinyl esters in the blood of most carnivores.
Comp. Biochem. Physiol. A 95: 573-575.

Schweigert, F. J., S. Uehlein-Harrell und H. Zucker: (1990b):
Effect of feeding on Vitamin A concentrations in blood of most carnivores.
J. Vet. Med. A 37: 605-609.

Schweigert, F. J., H. Zucker (1991):
Besonderheiten im Vitamin-A-Stoffwechsel der Ordnung Carnivora - eine Übersicht.
Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. 104: 89-91.

Schweigert, F. J., E. Thomann und H. Zucker (1991):
Vitamin A in urine of carnivores.
Int. J. Vitam. Nutr. Res. 61: 110-113.

Schweigert, F. J., E. Thomann (1993):
Vitamin A und E bei Karnivoren: Transport im Blut und Organverteilung.
Mh. Vet. Med. 48: 25-29.

Schweigert, F. J. (1998):
Vitamin A: Stoffwechsel, Genexpression und embryonale Entwicklung.
Übers. Tierernährg. 26: 1-24.

Schweigert, F. J., V. Bok (2000):
Vitamin A in blood plasma and urine of dogs is affected by the dietary level of vitamin A
Int. J. Vitam. Nutr. Res. 70: 84-91.

Schweigert, F. J., J. Raila und S. Haebel (2002):
Vitamin A excreted in the urine of canines is associated with Tamm-Horsfall like protein.
Vet. Res. 30: 299-311.

Seal, C. J., D. S. Parker (1991):
Isolation und characterization of circulating low molecular weight peptides in steer,
sheep, und rat portal und peripheral blood.
Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol. 99: 679-685.

Sherblom, A., J. Decker und A. V. Muchmore (1988):
The lectin-like inteaction between recombinant tumor necrosis factor und uromodulin.
J.Biol. Chem. 263: 5418-5424.

Shingleton, J. L., M. K. Skinner und D. E. Ong (1989):
Characteristics of retinol accumulation from serum retinol-binding protein by cultured
Sertoli cells.
Biochemistry 28: 9641-9647.

Sikri, K. L., C. L. Foster, F. J. Blomfield und R. D. Marshall (1979):
Localization by immunofluorescence und by light- und electron-microscopic
immunoperoxidase techniques of Tamm-Horsfall glycoprotein in adult hamster kidney.
Biochem. J. 181: 525-532.

Sikri, K. L., C. L. Foster, N. MacHugh und R. D. Marshall (1981):
Localization of Tamm-Horsfall glycoprotein in the human kidney using immuno-
fluorescence und immuno-electron microscopical techniques.
J. Anat. 132: 597-605.

Sikri, K. L., D-. P. Alexunder und C. L. Foster (1982):
Localization of Tamm-Horsfall glycoprotein in the normal rat kidney und the effect of
adrenalectomy on its localization in the hamster und rat kidney.
J. Anat. 135: 29-45.

Silbernagel, S. (1988):
The renal handling of aminoacids und oligopeptides.
Physiol. Rev. 68: 911-1007.

Silbernagel, S., V. Ganapathy und F. H. Leibach (1991):
H⁺-gradient driven dipeptide reabsorption in proximal tubule of rat kidney. Studies in
vivo und in vitro. Am. J. Physiol. 253: F 448-F 457.

Silverman, L. R., K. N. Khan (1999):
"Have you seen this?" Nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced renal papillary
necrosis in a dog.
Toxicol. Pathol. 27: 244-245.

Sivaprasadarao, A., J. B. C. Findlay (1988)
The interaction of retinol-binding protein with its plasma-membrane receptor.
Biochem. J. 255: 561-570.

Sivaprasadarao, A., J. B. C. Findlay (1994):
The interaction of retinol-binding protein with its plasma-membrane receptor.
Biochem. J. 255: 561-570.

Smith, F. R., D. S. Goodman (1971):

The effects of diseases of the liver, thyroid, und kidneys on the transport of vitamin A in human plasma

J. Clin. Invest. 50: 2426-2436.

Smith, F. R., D. S. Goodman (1976):

Vitamin A transport in human vitamin A toxicity.

New Engl. J. Med. 294: 805-808.

Smith, F. R., D. S. Goodman (1979):

Retinol-binding protein and the regulation of vitamin A transport.

Federation Proc. 38: 2504-2509.

Solez, K., R. H. Heptinstall (1978):

Intrarenal urinary extravasation with formation of venous polyps containing Tamm-Horsfall protein.

J. Urol. 119: 180-183.

Sommer, A. (1994):

Vitamin A: Its effect on childhood sight und life.

Nutr. Rev. 52: 60-66.

Soprano, D. R., K. J. Soprano und D. S. Goodman (1986):

Retinol-binding messenger RNA levels in the liver und in the extrahepatic tissue of the rat.

J. Lipid Res. 27: 166-171.

Sporn, M. B., A. B. Roberts (1994):

Introduction. In: The retinoids, biology, chemistry, und medicine.

Sporn, M. B., A. B. Roberts und D. S. Goodman (Hrsg.):

New York, Raven Press, 1-3.

Stein, G., S. Schone, D. Geinitz, K. Abendroth, F. Kokot, R. Funfstuck,

H. Sperschneider und E. Keil (1986):

No tissue level abnormality of vitamin A concentration despite elevated serum vitamin A of uremic patients.

Clin. Nephrol. 25: 87-93.

- Stevenson, F. K., A. J. Cleave und P. W. Kent (1971):
The effect of ions on the viscometric und ultracentrifugal behaviour of Tamm-Horsfall glycoprotein.
Biochim. Biophys. Acta. 236: 59.
- Stevensen, F. K. Alvarez, J. Kohatsu, R. Hardmeier, J. I. Kennedy und R. B. Gammon Jr. (1994):
Vitamin A is excreted in the urine during acute infection.
Am. J. Clin. Nutr. 60: 388-392.
- Stone, E. A., M. P. Littman, J. L. Robertson und K. C. Bovee (1988):
Renal dysfunction in dogs with pyometra.
J. Am. Vet. Med. Assoc. 193:457-464.
- Swartz, D., J. Hoogstraten (1959):
Renal papillary necrosis.
Brit. J. Urol. 31: 419.
- Takeyama, K., S. Kitanaka, T. Sato, M. Kobori, J. Yanagisawa und S. Kato (1997):
25-hydroxyvitamin D₃ hydrolase und vitamin D synthesis.
Science 277: 1827-1830.
- Tallman, M. S., J. W. Undersen; C. A. Schiffer, F. R. Apfelbaum und J. H. Feusner (1997)
All-trans-retinoic acid in acute promyelocytic leucemia.
New. Engl. J. Med. 337: 1021-1028.
- Tamm, I., F. L. Horsfall (1950):
Characterization und separation of an inhibitor of viral hemagglutination present in urine.
Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 74: 108-114.
- Tarugi, P., G. Ballarini, B. Pinotti, A. Franchini, E. Ottaviani und S. Calundra (1998):
Secretion of apoB- und apoA-I-containing lipoproteins by chick kidney.
J. Lipid. Res. 39: 731-743.

Teifalt, M., J. G. Thalhammer und M. Gemeiner (1999):
Klinische Relevanz quantitativer Bestimmung eines prostataspezifischen Proteins im Harn von Rüden. In: Zusammenfassung der Vorträge 8. Jahrestagung der Fachgruppe Innere Medizin und Klinische Laboratoriumsdiagnostik. Deut. Vetmed. Gesellschaft (Hrsg.): München, 81.

Thomann, E. (1989):
Vitamin-A-Stoffwechsel des Hundes und anderer Caniden: Transport im Blut, Organverteilung und Ausscheidung über den Harn.
Diss. Med. Vet. München.

Thulesen, J., P. E. Jørgensen, O. Torffvit, E. Nexø und S. S. Poulsen (1997):
Urinary excretion of epidermal growth factor und Tamm-Horsfall protein in three rat models with increased renal excretion of urine.
Regul. Pept. 72: 179-186.

Thurau, K. (1980):
Fundamental research.
MMW 122: 11-13

Tickle, C., L. Wolpert, J. Lee und B. Alberts (1982):
Local application of retinoic acid to the limb bud mimics the action of polarizing region.
Nature 296: 564-566.

Tiruppathi, C., V. Ganapathy und F. H. Leibach (1990):
Evidence for tripeptide symport in renal brush border membrane vesicles. Studies in a novel rat strain with a genetic absence of dipeptidylpeptidase IV.
J. Biol. Chem. 265: 2048-2053.

Tomlinson, P. A., R. N. Dalton, Turner und C. Chantler (1990):
Measurements of beta 2-microglobulin, retinol-binding protein, alpha 1-microglobulin und urine protein 1 in healthy children using enzyme-linked immunosorbent assay.
Clin. Chim. Acta 192: 99-106.

Tomlinson, P. A. (1992):
Low molecular weight proteins in children with renal disease.
Pediatr. Nephrol. 6: 565-571.

Tomlinson, P. A., J. M. Smellie, N. Prescod, R. N. Dalton und C. Chantler (1994).
Differential excretion of urinary proteins in children with vesicoureteric reflux und reflux nephropathy.
Pediatr. Nephrol. 8: 21-25.

Topping, M. D., H. W. Forster, C. M. Luczynska und A. M. Bernard (1986):
Measurement of urinary retinol-binding protein by enzyme-linked immunosorbent assay,
und its application to detection of tubular proteinuria.
Clin. Chem. 32: 1863-1866.

Torffvit, O., P. E. Jorgensen, A. L. Kamper, N. H. Holstein-Rathlou, P. P. Leyssac,
S. S. Poulsen und S. Strundgaard (1998):
Urinary excretion of Tamm-Horsfall protein und epidermal growth factor in chronic
nephropathy.
Nephron 79: 167-172.

Ullrich, K. J., K. Kramer und J. W. Boylan (1982):
Present knowledge of the counter-current system in the mammalian kidney.
Prog. Cardiovasc. Diss. 3: 395-431.

Ullrich, K. J. (1994):
Specificity of transporters for "organic anions" und "organic cations" in the kidney.
Biochim. Biophys. Acta. 1197: 45-62.

Underwood, B. A. (1984):
Vitamin A and cancer prevention conference - an introduction.
J. Natl. Cancer Inst. 73:1371-1372.

Vaden, S. L., E. A. Levine und P. Correa (1995):
Retrospective analysis of 106 dogs with acute renal failure.
J. Vet. Intern. Med. 9: 209.

Vahlquist, A., B. Berne und C. Berne (1982):
Skin content und plasma transport of vitamin A und β -carotene in chronic renal
failure.
Eur. J. Clin. Invest. 12: 63-67.
Vahlquist, A. (1980):

The identification of dehydroretinol (vitamin A₂) in human skin.
Experientia 36: 317-318.

Volpert, A., I. Nolte und I. Käufer-Weiß (1989):
Vertikale Natrium-Dodecyl-Sulfat-Polyacrylamid-Gradientengel-Elektrophorese im
Mikrosystem zur Differenzierung von Urinproteinen in der Diagnostik von
Nierenerkrankungen beim Hund.
Tierärztl. Prax. Suppl. 5: 24-28.

Vuilleumier, J. P., H. E. Keller, D. Gysel und F. Hunziker (1983):
Clinical chemical methods for the routine assessment of the vitamin status in human
populations. Part I: The fat-soluble vitamins A und E, und beta-carotene.
Int. J. Vitam. Nutr. Res. 53: 265-272.

Wald, G. (1968):
Molecular basis of visual excitation.
Science 162: 230-239.

Ward, S. J., P. Chambon, D. E. Ong und C. Bavik (1997):
A retinol-binding protein receptor-mediated mechanism for uptake of vitamin A to
postimplantation rat embryos.
Biol. Reprod. 57: 751-755.

Weaver, R. G. (1965):
Mechanical factors in the production of hydronephrosis.
J. Urol. 94: 514-519.

Weinstein, A. M. (1988):
Modelling the proximal tubule: Complications of the paracellular pathway.
Am. J. Physiol. 254: F 297-F 305.

Weiss, E. (1999):
Einteilung der Nephropathien. In: Grundriß der speziellen pathologischen Anatomie der
Haustiere. Dahme, E. und Weiss, E. (Hrsg.):
Stuttgart, Enke, 5. Aufl., 243-277.

Willett, W. C., M. J. Stampfer, B. A. Underwood, J. O. Taylor, C. H. Hennekens (1983):
Vitamins A, E, and carotene: effects of supplementation on their plasma levels.
Am. J. Clin. Nutr. 38: 559-566.

Willett, W. C., D. J. Hunter (1994):
Vitamin A und cancers of the breast, large bowel und prostate:
epidemiologic evidence.
Nutr. Rev. 52: 53-59.

Williams, J., R. Marshall, H. Van Hallbeek und J. F. G. Vliegenthart (1984):
Structural analysis of the carbohydrate moieties of human Tamm-Horsfall
glycoprotein.
Carbohydr. Res. 134: 141-155.

Wilson, D. E., I. F. Chan, A. K. Cheung, W. Dutz und K. N. Buchi (1985):
Retinyl ester retention in chronic renal failure. Further evidence for a defect in
chylomicron remnant metabolism.
Atherosclerosis 57: 189-197.

Wilson, D. E., J. Hejazi, N. L. Elstad, I. F. Chan, J. M. Gleeson und P. H. Iverius (1987):
Novel aspects of vitamin A metabolism in the dog: distribution of lipoprotein retinyl
esters in vitamin A-deprived und cholesterol-fed animals.
Biochem. Biophys. Acta. 922: 247-258.

Worden, A. N., J. Bunyan, A. W. Davies und C. E. Waterhouse (1955):
The urinary excretion of vitamin A by the dog.
Biochem. J. 59: 527-528.

Wright, N. G., E. W. Fisher, W. I. Morrison, W. B. Thomson und A. S. Nash (1976)
Chronic renal failure in dogs: a comparative clinical und morphological study of
chronic glomerulonephritis und chronic interstitial nephritis.
Vet. Rec. 98: 288-293.

Wright, N. G., G. Giebisch (1992):
Renal potassium transport: Contributions of individual nephron segments und
populations.
Am. J. Physiol. 235: F515-F527.

Yoshimoto, K., K. Kurokawa (1993):

Basolateral und luminal action of vasopressin in the distal nephron segments.

In: Vasopressin. Gross, Richter, Robertson (Hrsg.):

Paris, Libbey Eurotext, 301-310.

Zager, R. A., R. S. Cotran und J. R. Hoyer (1978):

Pathologic localization of Tamm-Horsfall protein in interstitial deposits in renal disease.

Lab. Invest. 38: 52-57.

Zollinger, H. U. (1966):

Niere und ableitende Harnwege. In: Spezielle pathologische Anatomie, Band 3.

Doerr, W., B. Uehlinger (Hrsg.): Berlin, Springer Verlag, 1034-1035.