

G. ANHANG

1. Triathlon




Abbildung 1: Thromboplastinzeit vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *unkorrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 2: aPTT vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *unkorrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 3: Faktor VIII vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 4: Faktor XII vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 5: Fibrinogen vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 6: von Willebrand Faktor vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 7: Fibrinmonomere vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 8: Tissue Plasminogen Aktivator vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 9: Plasminogen Aktivator Inhibitor vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 10: D-Dimere vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen




Abbildung 11: VEGF vor und nach dem Triathlon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 12 Teilnehmerinnen

2. Marathon




Abbildung 12: Thromboplastinzeit vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die unkorrigierten Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 13: aPTT vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die unkorrigierten Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 14: Faktor VIII vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 15: Faktor XII vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 16: Fibrinogen vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 17: von Willebrand Faktor vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 18: Fibrinmonomere vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 19: Tissue Plasminogen Aktivator vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 20: Plasminogen Aktivator Inhibitor vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 21: D-Dimere vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen




Abbildung 22: VEGF vor, direkt nach und 24h nach dem Marathon; angegeben sind die *korrigierten* Mediane, der zentrale Perzentilbereich (P_{25} bis P_{75}) sowie der Signifikanzwert (p) der 16 Teilnehmerinnen