

IX. ANHANG

1. Abkürzungen zu den Kennzahlen Tabellen
2. Statistische Kennzahlen der Kolikdauer bei den konservativ und operativ behandelten Kolikpatienten
3. Statistische Kennzahlen der Pulsfrequenz bei den konservativ und operativ behandelten Kolikpatienten
4. Statistische Kennzahlen der Atemfrequenz bei den konservativ und operativ behandelten Kolikpatienten
5. Statistische Kennzahlen der HKT-Werte bei den konservativ und operativ behandelten Kolikpatienten
6. Statistische Kennzahlen der Base excess Werte bei den konservativ und operativ behandelten Kolikpatienten
7. Statistische Kennzahlen der Klinikdauer bei den konservativ und operativ behandelten Kolikpatienten

Abkürzungen zu den statistischen Kennzahlen Tabellen

n Anzahl der Patienten

Q₁(25%) Erstes Quartil
Unter diesem Punkt liegen 25% der geordneten Werte.

Med Median
Er ist der mittlere Wert in der Rangordnung der Werte der Größe nach.
Unter diesem Punkt liegen 50% der geordneten Werte.

Q₃ (75%) Drittes Quartil
Unter diesem Punkt liegen 75% der geordneten Werte.

Max Maximaler Wert

Min Minimaler Wert

Q₃ – Q₁ Quartilabstand
Er gibt die Differenz des oberen zum unteren Quantil an.
Kann als Spannweite der 50% mittleren Datenpunkte interpretiert werden.

Range gibt die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten gemessenem Wert an.

In Stunden	n=1023	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	951	2	5	10	240	1	8	239
verstorben	72	4	6	10	120	1	6	119

Tab. Ia.: Statistische Kennzahlen der Kolikdauer bei den konservativ behandelten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg (p<0,05)

In Stunden	n=253	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	125	3	5	8,5	120	1	5,5	119
verstorben	128	3	5,5	10	72	1	7	71

Tab. Ib.: Statistische Kennzahlen der Kolikdauer bei den operierten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg (p<0,05)

Schläge/min	n=1112	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	1037	40	44	52	140	24	12	116
verstorben	75	52	72	88	128	28	36	100

Tab. IIa.: Statistische Kennzahlen der Pulsfrequenz bei den konservativ behandelten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg (p<0,05)

Schläge/min	n=285	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	129	44	52	64	120	24	20	96
verstorben	129	48	60	80	160	24	32	136

Tab. IIb.: Statistische Kennzahlen der Pulsfrequenz bei den operierten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg ($p < 0,05$)

Züge/min	n=1067	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	999	16	20	24	108	8	8	100
verstorben	68	20	27	36	88	10	16	78

Tab. IIIa.: Statistische Kennzahlen der Atemfrequenz bei den konservativ behandelten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg ($p < 0,05$)

Züge/min	n=236	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	117	16	24	32	84	12	16	72
verstorben	119	20	24	36	80	8	16	72

Tab. IIIb.: Statistische Kennzahlen der Atemfrequenz bei den operierten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg ($p < 0,05$)

%	n=1038	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	965	34	37	40	76	22	6	54
verstorben	73	38	45	57,5	80	19	19,5	61

Tab. VIa.: Statistische Kennzahlen der HKT-Werte bei den konservativ behandelten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg ($p < 0,05$)

%	n=262	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	128	35	39	43,75	65	27	8,75	38
verstorben	134	38	44	54	75	25	16	50

Tab. VIb.: Statistische Kennzahlen der HKT-Werte bei den operierten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg ($p < 0,05$)

mmol/l	n=489	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	443	-3,0	-0,7	1,3	12,2	18,9	-1,7	-6,7
verstorben	43	-8,5	-2,7	0,0	4,8	-17,8	-8,5	-13

Tab. Va.: Statistische Kennzahlen der Base excess Werte bei den konservativ behandelten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg ($p < 0,05$)

mmol/l	n=167	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	73	-4,9	-1,2	1,2	6,6	-16,8	-3,7	-10,2
verstorben	94	-6,45	-2,1	0,75	13,3	-17,4	-5,7	-4,1

Tab. Vb.: Statistische Kennzahlen der Base excess Werte bei den operierten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg (p<0,05)

In Tagen	n=1128	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	1048	2,0	3,0	5,0	79	0	3	79
verstorben	80	0,0	2,0	3,75	41	0	3,75	41

Tab. VIa.: Statistische Kennzahlen der Klinikdauer bei den konservativ behandelten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg (p<0,05)

In Tagen	n=285	Q1 (25%)	Median	Q3 (75%)	Maximum	Minimum	Quartilabstand	Range
geheilt	140	14,25	17,00	23,00	92	4	8,75	88
verstorben	145	0,00	0,00	2,00	231	0	2	231

Tab. VIb.: Statistische Kennzahlen der Klinikdauer bei den operierten Kolikern in Abhängigkeit von Erfolg und Misserfolg (p<0,05)